

MALAISES & AFFECTIONS SPÉCIFIQUES

Focus sur le MARCHE secondaire

Le but de cette séquence est de faire comprendre au stagiaire l'importance du bilan secondaire dans la recherche des signes et dans le recueil des chiffres.

L'AVC 06AC01/06-2018 page 184 et 06PR01/ 06/2018 page 186

CRISE CONVULSIVE GENERALISEE 06AC02/06-2018 p 187 et 06PRO2/06-2018 pages 189

MALAISE HYPLOGLYCEMIQUE CHEZ DIABETIQUE

06AC05/06-2018 p 196 et 06PRO5/06-2018 page 198

QPACRE 6.10

3 MSP avec des tableaux cliniques +/- similaires sur le thème des malaises. Dans les 3 MSP, besoin d'un témoin pour passer l'alerte. Vous pouvez y ajouter une notion de chute de façon à s'interroger « chute d'origine malaise ? Ou par maladresse ? ».

MSP 1 : victime présentant des troubles de la parole depuis 15/30 minutes. Victime au sol à l'arrivée des secours.

Lors du bilan, constantes (TA, pouls, FR et SatO2, glycémie et température) normales MAIS FAST positif (asymétrie du visage, propos incohérents, hémiplegie sur un des côtés).

MSP 2 : victime retrouvée au sol, désorientée (ne se souvient plus de ce qui s'est passée), réagit à la voix. Devient de plus en plus cohérente.

Lors du bilan, constantes normales (comme dans MSP 1) MAIS découverte lors de la recherche d'antécédent que la victime est traité par dépakine pour épilepsie.

Si le formateur veut aborder la problématique de l'hyperthermie, il vaut mieux privilégier une victime nourrisson ou enfant.

MSP 3 : victime retrouvée au sol, a perdu connaissance, tient des propos incohérents avec tendance à la somnolence.

Lors du bilan, toutes les constantes sont normales sauf la glycémie capillaire qui est inférieure à 60 mg/dl.

Idée pour la synthèse formateur

En plénière :

	Bilan circonstanciel (éléments principaux)	MARCHE secondaire « R »	MARCHE secondaire « C »	MARCHE secondaire « H »	MARCHE secondaire « E »
Cas 1 AVC					
Cas 2 Crise convulsive					
Cas 3 Hypoglycémie					

Conclusion

Le formateur fera ressortir l'importance de la prise en compte de tous les éléments présents dans le Bilan MARCHE SECONDAIRE permettant ainsi d'éviter la confusion entre les 3 cas et de permettre la mise en œuvre de procédures et gestes de secours adaptés à chaque situation et une meilleure orientation vers l'hôpital de destination.