



Ce document de synthèse réalisé par la DGSCGC est à titre d'information et ne remplace pas la lecture des recommandations en vigueur. Dans le but d'aider les formateurs, il reprend les ajouts, reformulations, suppressions et corrections.

Précision : la version présentée a fait l'objet de multiples corrections de forme, orthographiques ou syntaxiques qui ne sont pas reprises dans ce tableau. A noter que l'ensemble des modifications apportées au PSC1 ont été retranscrites dans le PSE dans un but d'uniformisation.

Fiche	Type	Avant	Après	Justification
Le citoyen de Sécurité Civile	Ajout Reformulation	Se mobiliser, c'est aussi adopter des gestes simples qui inscrivent chaque citoyen dans une démarche responsable et solidaire : donner son sang, avoir les bonnes pratiques numériques face à l'urgence	Se mobiliser, c'est aussi adopter des gestes simples qui inscrivent chaque citoyen dans une démarche responsable et solidaire : donner son sang, avoir les bonnes pratiques numériques face à l'urgence, installer une application téléphonique de sollicitation citoyenne permettant d'être alerté et mobilisé par les secours en cas d'arrêt cardiaque à proximité (exemples : Staying Alive, Sauv Life, Permis de Sauver, etc.), etc.	Ajout d'une source officielle d'information
La focalisation/défocalisation attentionnelle	Reformulation	D'autres tâches attentionnelles permettent également de stabiliser la victime, en l'incitant par exemple à parler d'un sujet extérieur à l'intervention, comme par exemple l'interroger sur son activité professionnelle, ses loisirs, ses dernières vacances ...	D'autres tâches attentionnelles permettent également de stabiliser la victime, en l'incitant par exemple à parler d'un sujet extérieur à l'intervention (activité professionnelle, loisirs, dernières vacances, etc.)	Reformulation
Généralités sur les bilans	Correction	Le deuxième regard progresse vers la victime et a pour objectif d'identifier une détresse vitale ainsi que la plainte principale ;	Le deuxième regard progresse vers la victime et a pour objectif d'identifier une menace vitale ainsi que la plainte principale ;	Alignement des terminologies avec les autres fiches
Troisième regard	Reformulation	Fonctions vitales	Fonctions vitales	Formulation confuse sur l'ordre d'évaluation des fonctions.
Quatrième regard	Reformulation	Fiche	Fiche	Reformulation

Retournement à deux secouristes	Précision	Fiche	Fiche	Nécessité d'ouvrir la technique pour prendre en compte des cas de victimes suspectes d'un traumatisme et conscientes
Retournement à un secouriste	Précision	Fiche	Fiche	Nécessité d'ouvrir la technique pour prendre en compte des cas de victimes conscientes, non traumatisées, mais ne pouvant pas se retourner seules
Mesure de la pression artérielle	Correction Précision	Fiche	Fiche	Correction de terminologie et précision suite à question sur des cas ne permettant pas de poser le brassard
Évaluation de la fonction neurologique	Correction	Fiche	Fiche	Harmonisation des terminologie dans la fiche
Mesure de la douleur	Correction	L'enfant nécessite une prise en charge de la douleur si le score est de 3-4/10.	L'enfant nécessite une prise en charge de la douleur si le score est supérieur ou égal à 4	3-4 est une valeur de seuil, les valeurs au-dessus nécessitent une prise en charge de la douleur
Arrêt cardiaque	Correction Ajout	Electrocution	Electrisation [...] Installer sur son téléphone une application de sollicitation citoyenne (exemples : Staying Alive, SAUV Life, permis de sauver, etc.) permet d'être alerté et mobilisé par les services de secours en cas d'arrêt cardiaque à proximité et contribue à une prise en charge précoce en attendant leur arrivée.	Correction en lien avec une autre fiche Harmonisation avec le PSC1
Perte de connaissance	Correction	Au cours du bilan d'urgence vital, l'appréciation de la conscience est réalisée en quelques secondes.	Au cours du 2ème regard, l'appréciation de la conscience est réalisée en quelques secondes.	Coquille lors de la conversion en regard

Perte de connaissance en sauveteur isolé	Reformulation	Fiche	Fiche	Harmonisation avec le PSC1
Obstruction complète des voies aériennes	Reformulation	Fiche	Fiche	Harmonisation avec le PSC1
Désobstruction par la méthode des claques dans le dos	Reformulation	Fiche	Fiche	Harmonisation avec le PSC1
Compressions thoraciques	Reformulation	Fiche	Fiche	Reformulation de la partie générique « Réalisation » applicable que la victime soit adulte, enfant, nourrisson. Suppression d'un doublon avec la fiche « prise en charge du nouveau-né à la naissance »
Section de membre	Reformulation	Fiche	Fiche	Reformulation dans un but de simplification suite à questionnement
Désobstruction par des claques dans le dos	Reformulation	Fiche	Fiche	Harmonisation avec les fiches PSC1
Désobstruction par la méthode des compressions abdominales	Reformulation	Fiche	Fiche	Harmonisation avec les fiches PSC1

Désobstruction par la méthode des compressions thoraciques	Reformulation	Fiche	Fiche	Harmonisation avec les fiches PSC1
Garrot	Reformulation	Fiche	Fiche	Harmonisation avec les fiches PSC1
Gaze imbibée de substance hémostatique	Correction Précision	Pansement	Gaze	Remplacement d'anciennes terminologies
Libération des voies aériennes chez une victime non traumatisée	Correction	pour apprécier la ventilation d'une victime qui a perdu connaissance lors du bilan d'urgence vitale ;	pour apprécier la ventilation d'une victime qui a perdu connaissance lors du 2ème regard ;	Coquille lors de la conversion en regard Harmonisation avec le PSC1
Libération des voies aériennes chez une victime traumatisée	Correction	pour apprécier sa ventilation lors du bilan d'urgence vitale ;	pour apprécier sa ventilation lors du 2ème regard ;	Coquille lors de la conversion en regard
Ventilation artificielle par une méthode orale	Reformulation	Fiche	Fiche	Harmonisation avec les fiches PSC1
Position latérale de sécurité à un secouriste	Reformulation	Fiche	Fiche	Harmonisation avec les fiches PSC1
Accident électrique	Correction	Electrocution	Electrisation	Correction
Syndrome de suspension	Correction	Electrocution	Electrisation	Correction
Traumatisme du bassin	Correction	une douleur du bassin ;	une douleur localisée au niveau du bassin ;	Sémantique

Traumatisme du dos et du cou	Correction	Rechercher en priorité une détresse vitale Devant une victime qui présente un traumatisme avec suspicion d'une lésion du rachis (cervical, thoracique, lombaire ou sacré), il faut rechercher en priorité détresse vitale :	Rechercher une menace ou détresse vitale Devant une victime qui présente un traumatisme avec suspicion d'une lésion du rachis (cervical, thoracique, lombaire ou sacré), il faut rechercher en priorité une menace ou détresse vitale :	Harmonisation avec les fiches du bilan
Traumatisme du dos et du cou	Correction	☑ toute détresse vitale doit être traitée prioritairement selon la conduite à tenir adéquat ☑ si la victime traumatisée est : - o inconsciente et respire, elle doit être mise en PLS à 2 sauveteurs ou plus, en maintenant manuellement la tête de la victime dans l'axe lors de la rotation (ne pas retirer le collier cervical si celui-ci est déjà en place) ; - o consciente, continuer à limiter les mouvements du rachis : ☑ en demandant à la victime de ne pas bouger si la situation le permet (victime consciente, environnement favorable) ; ☑ en stabilisant la tête de la victime. Il est aussi possible, pour libérer le secouriste ou pour éviter qu'il ne gêne la réanimation, de restreindre les mouvements du rachis cervical en utilisant des blocs de tête ; ☑ demander un avis médical et respecter les consignes	• toute menace ou détresse vitale doit être traitée prioritairement selon la conduite à tenir adéquate ; • si la victime traumatisée est consciente, continuer à limiter les mouvements du rachis : - o en demandant à la victime de ne pas bouger si la situation le permet (victime consciente, environnement favorable) ; - o en stabilisant la tête de la victime. Il est aussi possible, pour libérer le secouriste ou pour éviter qu'il ne gêne la réanimation, de restreindre les mouvements du rachis cervical en utilisant des blocs de tête ; • demander un avis médical et respecter les consignes	Harmonisation avec les fiches du bilan Suppression de la référence à la notion d'inconscience qui est traitée dans la première puce et redondante avec des fiches déjà existantes

Traumatisme des membres	Correction	L'expression du mécanisme : un traumatisme des membres ou des articulations est (chute ou choc violent...).	L'expression du mécanisme : Un traumatisme des membres ou des articulations (chute, choc violent, etc).	Correction d'une phrase
Traumatisme de la face et de la face antérieure du cou	Correction	À l'issue du bilan d'urgence vital, la victime peut présenter :	À l'issue du 2ème regard, la victime peut présenter :	Coquille lors de la conversion en regard
Contention pelvienne	Précision	Pont à plusieurs sauveteurs	Pont adapté, à plusieurs sauveteurs	Précision suite à question de la nécessité de choisir la technique de pont au regard de la situation
Maintien de la tête en position neutre	Reformulation Précision	se placer à genoux dans l'axe de la victime, à la tête ; Il est possible de prendre appui, avec les coudes, sur le sol ou sur les genoux pour diminuer la fatigue. ☑ placer les mains de chaque côté de la tête de la victime ; si la tête n'est pas dans l'axe du corps, la replacer délicatement dans l'axe du tronc sans exercer de traction jusqu'à ce que la victime regarde droit devant. ☑ maintenir la position : ○ au moins jusqu'à l'immobilisation du rachis cervical, ○ en général, jusqu'à l'immobilisation complète du rachis. [...] Dans ces cas, maintenir la tête dans la position où elle se trouve dans l'attente d'un renfort.	• demander à la victime de ne pas bouger la tête et la prévenir de ce que l'on va faire ; • se placer en position stable à genou dans l'axe de la victime, au niveau de sa tête ; • prendre appui avec les coudes sur le sol ou sur les genoux ; • placer les mains de chaque côté de sa tête pour la maintenir dans la position où elle se trouve ; • replacer la tête, si nécessaire, délicatement, dans l'axe du tronc, sans exercer de traction, jusqu'à ce que la victime regarde droit devant. [...] Dans ces cas, maintenir la tête dans la position où elle se trouve dans l'attente d'un renfort médical.	Précision suite à questionnement Harmonisation avec le PSC1

Pose d'un collier cervical	Reformulation Ajout	Le collier cervical ne doit pas être utilisé s'il existe une contre-indication comme : ☒ une possible obstruction des voies aériennes ; ☒ une déformation préexistante du rachis cervical (dans ce cas, maintenir la tête dans la position où elle se trouve). [...] Victime assise	Le collier cervical ne doit pas être utilisé s'il existe : • une possible obstruction des voies aériennes ; • une impossibilité de mettre la tête en position neutre (déformation préexistante du rachis cervical). [...] Victime assise ou debout	Reformulation suite à une écriture en doublon avec la fiche maintien de la tête en position neutre, préalable à la pose d'un collier. Référence de fiches à la pose de collier en position assise, mais jamais évoqué dans la fiche
Accouchement inopiné	Correction	Fiche AC et PR	Fiche AC et PR	Corrections de la confusion entre femme enceinte et parturiente.
Situations à nombreuses victimes	Correction	L'organisation de la réponse de la sécurité civile (ORSEC) est définie par le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 modifié relatif au plan ORSEC et pris pour application des articles L741-1 à L741-5 du Code de la sécurité intérieure.	Le Code de la sécurité intérieure fixe l'organisation de la réponse de sécurité civile (ORSEC).	Correction suite à abrogation et modification d'un décret et de textes de loi.
Repérage en cas de nombreuses victimes	Correction Reformulation	Fiche	Fiche	Précisions, corrections et reformulations mineures de la fiche Initialement associée au 1 ^{er} regard, repositionnement dans « situations particulières »