

Q

uand ?



Lorsque qu'une victime, consciente ou inconsciente, portant un casque de protection est allongée sur le ventre

P

ourquoi ?



Victime consciente casquée sur le ventre :

Le port d'un casque de protection (quel qu'il soit) peut entraîner une hyper flexion de la nuque lors de la mise en place sur le plan dur.

Afin d'éviter ce risque d'aggravation possible et tout en respectant l'axe « tête-cou- tronc », la technique du retournement à 3 secouristes sans plan dur sera privilégiée.

Victime inconsciente casquée sur le ventre :

Une victime inconsciente à plat ventre portant un casque de protection sera retournée par la méthode du retournement d'urgence à 2 secouristes, au minimum, afin de rapidement libérer les voies aériennes et apprécier la ventilation.

A

vec quoi ?



- Matériel de restriction du Rachis cervical
- Brancard cuillère
- MID et sa pompe.

C omment ?

Logigramme de la procédure Victime inconsciente

Victime casquée inconsciente sur le ventre

Stabilisation du Rachis permanent

(Maintien tête prise latéro-latérale, dû à la présence du casque)

Retournement d'urgence à 2 secouristes, au minimum

(Si présence d'un 3^{ème} secouriste, celui-ci peut se mettre au niveau des membres inférieurs lors du retournement)

Retrait du casque

Bilan primaire

- Libération des voies aériennes par élévation du menton
- Appréciation de la respiration avec prise de pouls en simultané

Respiration présente et efficace

Absence de respiration ou respiration agonique

Poursuivre bilan primaire

Procédure RCP

Logigramme de la procédure

Victime consciente

Victime casquée consciente sur le ventre



Stabilisation du Rachis permanent

(Maintien tête prise latéro-latérale, dû à la présence du casque)



Retournement à 3 secouristes

(A même le sol)



Retrait du casque



Bilan primaire