Module complémentaire

ACTES DE SOINS D'URGENCE

ASU n°3

Secours et Soins d'Urgence Aux Personnes

SDIS SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA MARNE

FICHE TECHNIQUE : Utilisation du spray de glucagon en intranasal

Actes de soins d'urgence 10-2025

Quand

VIDEO ICI
Cliquez ou scannez-moi

D 

Avant toute prise en charge, rechercher, si possible, l'existence d'une maladie diabétique.
Tous les éléments suivants doivent être présents :

- Victime de 4 ans et plus ;
- Bilan primaire **critique en D,** avec **trouble de déglutition** et glycémie capillaire **inférieure à 0,60g/L** ;
- Sur **prescription médicale** du **médecin régulateur** ou **sapeur-pompier.** Cette prescription est **obligatoire** et peut être réalisée à la demande du médecin régulateur ou sur proposition du chef d'agrès.

Pourquoi

On parle d'hypoglycémie sévère lorsque le taux de sucre dans le sang atteint un seuil critique anormalement bas. L'hypoglycémie est établie lorsque la glycémie est inférieure à 0,80g/L et devient sévère lorsqu'elle est inférieure à 0,60g/L. Ce très faible taux de sucre dans le sang peut provoquer une altération sévère de l'état neurologique allant jusqu'au coma et de fait, la mort.
On recourt au glucagon en spray intranasal afin d'augmenter le taux de sucre dans le sang et donc d'améliorer l'état neurologique de la victime.

Avec quoi

Avec **la prescription médicale du médecin,** on administre le spray de glucagon (Baqsimi®). Le glucagon se présente sous forme d'une poudre à l'intérieur du dispositif. Celle-ci est absorbée passivement par la muqueuse nasale et ne nécessite donc pas d'inhalation ou d'inspiration active de la victime.




Comment

Il existe un seul dispositif avec un dosage unique de 3mg. Ce produit s'administre dans toutes les positions d'attente. Après prescription médicale, le produit doit être administré comme suit :

Préparation de la dose



Retirez le film plastique en tirant sur la bandelette rouge.



Ouvrez le couvercle et retirez le récipient unidose du tube.

Attention : N'appuyez pas sur le piston avant insertion dans la narine. Sinon, la dose unique du récipient unidose sera perdue.

Administration de la dose :



- **TENEZ** le récipient unidose comme montré sur l'image. **N'appuyez pas sur le piston avant l'insertion dans la narine.**



- **INSEREZ** l'embout dans l'une des narines.



- **APPUYEZ** sur le piston entièrement **jusqu'à ce que la ligne verte ne soit plus visible.**

Après administration de la dose

- Si la personne est inconsciente :
  - Tournez-la sur le côté après avoir administré BAQSIMI®.
  - **Contactez immédiatement une assistance médicale.**
- Dès que la personne a repris connaissance et est à nouveau capable d'avaler, encouragez-la à prendre une collation très sucrée (comme du sucre, du jus de fruit, des biscuits) puis du pain, pour éviter qu'une hypoglycémie ne revienne.
- **Jetez le récipient et le tube usagés conformément à la réglementation locale en vigueur.**

Vérifier la glycémie en référence à la procédure (PR) de resucrage.

Risques

- Peut provoquer une hyperglycémie modérée.

Efficacité

- L'état de conscience de la victime s'améliore voire revient à la normale à environ 15 minutes de l'administration ;
- Sa capacité de déglutition est tout ou en partie restaurée.