


# MÉMENTO Chef d'Agrès

**SAMU 91 : 01.69.13.95.18**

(sauf BILAN ROUGE par RADIO ou à défaut CTA par téléphone dédié GSM de service)

**COORDINATION (7h-19h) : 01.69.13.91.22 ; NUIT : 01.69.13.91.13**

## La RÉANIMATION CARDIO PULMONAIRE

Morphologie	Débit Insufflation (L/min)	Rythme	Zone d'appui	Aspiration	
				Dépression / Durée max.	
Adulte et adolescent	15	Noyé : 5 insuff. puis 30/2 rythme 100-120		-0.35 à 0.5b	10 s
Enfant	15	5 insuff. puis 15/2 rythme 100-120		-0.2 à 0.35b	5 s
Nourrisson	15	5 insuff. puis 15/2 rythme 100-120		-0.2 à -0.25b	5 s
Nouveau-né à la naissance	6	40 insuff. AA en 1 min puis 3/1 rythme 120		-0.12 à 0.15b	5 s en commençant par la bouche

**Pas de DSA sur un nouveau-né (venant de naître)  
Réévaluer l'état du nouveau-né toutes les minutes : pouls < 60 BPM = RCP**

## L'INHALATION

(Objectif de saturation : 94 à 98% ou 89 à 94% pour IRC)

MHC (adulte et pédiatrique)		Masque simple (Adulte et pédiatrique)	Lunettes d'O2
Débit initial	15 l/min	10 l/min	2l /min ou 1 à 2 l/min de + que le débit actuel
Plage de débit d'utilisation	8 l/min à 15 l/min	6 à 10 l/min	1 à 6 l/min

## LE SCORE DE GLASGOW

(à partir de l'âge de 5 ans.)


	Ouverture des yeux (Y)	Réponse verbale (V)	Réponse motrice (M)
6			À la demande
5		Orientée / cohérente	Orientée adaptée
4	Spontanée	Confuse	Évitement non adapté
3	À la demande	Inappropriée	Flexion
2	À la douleur	Grognement / incompréhensible	Extension + rotation interne
1	Nulle	Nulle	Nulle
Stimulus verbal		Stimulus douloureux	

**Seul le roulement appuyé d'un stylo à la base de l'ongle est accepté comme déclenchement de la douleur**

## LES PARAMÈTRES VITAUX

	Adulte et Adolescent	Enfant	Nourrisson	Nouveau-Né
Age	A partir de la puberté	2 ans à la puberté	28 jours à 2 ans	0 à 28 jours
FR	12 à 20	20 à 30	30 à 40	40 à 60
FC	60 à 100	70 à 140	100 à 160	120 à 160
PA	120 / 80 mmHg ou habituelle	70 mmHg + 2 x âge en années		
la GLYCÉMIE	<b>Hypoglycémie</b>	<b>Glycémie normale</b>		<b>Hyperglycémie</b>
	Inférieur à 3.5 mmol/L	Entre 3,5 et 6.1 mmol/L		Supérieur à 6.1 mmol/L

## L'ABDOMEN



1. Hypochondre droit
2. Epigastre
3. Hypochondre gauche
4. Flanc Droit
5. Zone péri-ombilicale
6. Flanc Gauche
7. Fosse iliaque droite
8. Zone sous ombilicale
9. Fosse iliaque gauche

## LES PUPILLES



**Myosis**




**Mydriase**



**Anisocorie**

## LES BRÛLURES



### CAT : simples

- Supprimer la cause
- Refroidir jusqu'à disparition de la douleur
- Protéger brûlure
- Ne pas percer le phlyctènes

### CAT : graves

- **Supprimer** la cause
- **refroidir** dans les 30 min si consciente et
- la surface brûlée** est :
  - < 5 % Nourrisson
  - < 10 % Enfant
  - < 30 % Adulte
- eau 15 à 25° ou kit brûlures
- Arroser 10 minutes minimum
- Ne pas percer les phlyctènes
- Protéger brûlure
- Position d'attente
- Retirer vêtements bijoux
- Ne pas mobiliser
- Protéger la victime

*\*Face palmaire (paume + doigts) de la main de la victime = 1% de la surface quel que soit l'âge*

## TRANSMISSION SIMPLIFIÉE DU BILAN

### VICTIMES CONCERNÉES

- Agées de 10 à 75 ans
- Victime consciente, orientée, non intoxiquée, sans signe de gravité circulatoire, respiratoire et neurologique.
- Présentant un ou plusieurs traumatismes et/ou lésions bénignes relevant des affections listées ci-dessous.

### AFFECTIONS RELEVANT DE LA PROCÉDURE

**Traumatisme fermé** non hémorragique sans déformation ni trouble sensitif ou moteur des membres inf. ou sup.

**Plaie simple** des membres supérieurs et inférieurs

**Plaie non hémorragique** du menton, de l'arcade sourcilière, du cuir chevelu

**Contusion** des membres type ecchymose ou égratignure inférieure à 5% de la surface cutanée du blessé

**Brûlure thermique simple** inf. à 1% (la paume de la main de la victime = 1% de sa surface corporelle)

**Message type à transmettre au CTA/CODIS via canal SSU/0ps** « Transmission simplifiée du bilan, transport CH x »

## NO.VI (Catégorisation des victimes)

**DCD (morgue)** **Victime** dont le décès ne fait aucun doute (tête séparée du tronc, victime déchiquetée, raideur cadavérique, démembrée, ou en décomposition) / **Victime** qui a perdu connaissance et qui ne respire pas.

**JA (PRV)** **Victime** qui présente une hémorragie ou qui a perdu connaissance et qui respire (après une éventuelle LVA)  
**Victime** consciente qui présente une détresse vitale évidente (FR > 30 min ou FC > 120 min chez l'adulte)

**UR (PRV)** **Victime** consciente qui ne présente pas de détresse vitale et qui ne peut se déplacer

**IMP (PRI)** **Victime** consciente qui ne présente pas de détresse vitale et qui peut se déplacer, seule ou avec de l'aide

### SEUILS DE DÉCLENCHEMENT (À titre indicatif)

Moyens	VSAV	Groupe SAP	2 Groupes SAP	NOVI 1 BPMA	NOVI 2 BPMA
Seuils	1 victime	1 à 4 victimes avec ou sans VLM	5 à 8 victimes	9 à 24 victimes avec une limite à 6 UA au maximum	25 victimes et plus <b>Ou</b> à partir de 7 UA