

Version 1

Rédigé le ... par
SOPS

Validé le ... par le DDSIS

OPS_RAD

18

RBC

Prise en charge d'une victime potentiellement contaminée valide dans un local clos**Domaine d'utilisation**

Risque principal : CONTAMINATION

Contamination des intervenants et de la victime

Risque potentiel : DISSÉMINATION de la contamination Air – Sol – Eau

Equipement individuel

Tenue de protection individuelle : Tenue type 3, masque ARI avec cartouche NRBC, 2 paires de gants, surbottes

Dosimétrie active type DMC 2000 XB et Dosimétrie passive RPL.

Matériels

Matériels à préparer :

1 tenue type 5 avec lunette et masque pour la victime avec surbottes

3 feuilles de polyanes ou vinyles, 1 sac poubelle

Préparation du SAS en sortie

MGO

- Pas de contact physique avec les impliqués et les premiers intervenants (SP non spécialistes)
- Prise de renseignements et consignes aux impliqués et premiers intervenants : effectuer un minimum de mouvements, ne pas porter les mains au visage, pas de contact inutile avec le sol, ne pas boire, fumer et manger.
- Soustraire et Isoler les impliqués et les premiers intervenants.
- Isoler le local (portes, fenêtres, arrêt ventilation).
- Contact verbal avec la victime dans le local et prise de renseignements.
- Déposer au sol en limite de sortie 2 feuilles de polyanes ou vinyles dans le local et 1 feuille de polyane après le saut de zone hors du local.
- Demander à la victime de venir jusqu'au feuillets de polyanes ou vinyles.
- 1er contrôle de contamination (visage et mains) dans le local si ambiance non polluée.
- Lui demander de mettre le masque, les lunettes et une paire de gants et lui demander de se déshabiller et de déposer ses affaires souillées dans un sac poubelle avec sa paire de gants.
- Nouveau contrôle de contamination (pieds, mains, bouche) et saut de zone pour la phase de rhabillage en tenue type 5.
- Sortie et isolement de la victime.
- Fermeture du local concerné.

Rappels

L'urgence médicale prime sur le risque RAD

Si contrôle contamination positive, transport sur un CH de référenceL'urgence médicale prime sur le risque RAD
Consignes aux impliqués : minimum de mouvements, ne pas porter les mains au visage, pas de contacts inutiles avec le sol, mettre un masque FFP2 pour la protection des voies respiratoires (ne pas manger / fumer ou boire)