


L'accouchement inopiné

Définition :

L'accouchement inopiné est l'acte de mettre au monde un nouveau-né hors d'une maternité

Il peut survenir avant l'arrivée des secours ou en leurs présences

L'accouchement se déroule en 3 étapes



Causes :

Les causes de l'accouchement inopiné sont multiples, allant de la grossesse mal ou non suivie, à la multiparité

Signes :

Contractions rapprochées et plus douloureuses

Rupture de la poche des eaux

Tête du nouveau-né visible au niveau de la vulve de la mère

Conduite à tenir : L'accouchement

1) L'accouchement n'a pas encore eu lieu, le transport peut se faire :

Placer la mère sur le côté

Bilan + questions

Grossesse suivie ou non
Nombre d'accouchement
Date et lieu prévu
Grossesse simple ou multiples
Type d'accouchement (voie basse ou césarienne).
Nature (tête, siège, épaule)
Heure de début des contractions, la durée et l'intervalle
Heure de la perte des eaux

2) L'accouchement n'a pas encore eu lieu, mais le transport ne peut pas se faire :

Préparer le KIT d'accouchement

Préparer des serviettes de bain propre

Préparer un récipient pour recueillir les liquides biologique

Mettre des gants à usage unique

Mettre un masque de protection

Installer la mère en position demi-assise, cuisses fléchies et écartées

Lui demander de pousser vers le bas dès qu'elle ressent une contraction

Au moment de l'expulsion maintenir la tête du nouveau-né avec les 2 mains sans s'opposer à sa rotation naturelle

Une fois la tête sortie, vérifier la présence du cordon autour du cou et l'enlever progressivement si il est présent

Soutenir le corps du nouveau-né, attention celui-ci est très glissant

Le poser sur la mère

Noter l'heure de naissance

Assurer la prise en charge du nouveau-né

Surveiller la mère jusqu'à la délivrance



3) L'accouchement est déjà réalisé :

Bilan sur la mère et nouveau-né

Si absence d'une équipe médicale, laisser sortir le placenta sans tirer sur le cordon ombilical, recueillir le placenta dans un récipient ou sac en plastique et l'acheminer vers l'hôpital

S'assurer de la non présence d'hémorragie

Placer un pansement absorbant

Surveillance de la mère et du nouveau-né