


Les hémorragies

Définition :

Une hémorragie est une perte de sang abondante, qui ne s'arrête pas spontanément
Elle peut être externe, extériorisée ou interne, secondaire ou non à un traumatisme

Risques et conséquences :



La perte abondante ou prolongée de sang conduit à une détresse circulatoire qui menace immédiatement ou à très court terme la vie d'une victime

Hémorragie externe :



Conduite à tenir :

En l'absence de corps étranger, **appuyer** avec les doigts ou la paume de la main (compression manuelle) en étant protégé par un gant à usage unique

1



+ **Allonger** la victime



Si cette action est inefficace :

Mettre en place un garrot



2

Interposer le plus tôt possible entre la main et la plaie des compresses, un **pansement compressif** ou un **CHUT** (coussin hémostatique d'urgence).

Si cette action est inefficace :

Mettre en place un garrot



Sur les parties non garrotable, (pli de l'aîne, sous l'aisselle, fesse, cou et tête) mettre en place un 2^{ème} pansement compressif en cas d'inefficacité du 1^{er}


Hémorragie externe avec présence de corps étranger, fracture ou multiples victimes :

Ne pas toucher au corps étranger ou
morceau d'os visible



Si le saignement reste important réaliser la pose d'un
garrot (2 types)

Garrot improvisé
(lien large 3 à 5 cm, et long 1,50m)



Faire 2 tours autour du
membre à quelques
centimètres de la plaie,
faire un nœud et placer un
bâton, refaire 2 nœuds puis
tourner jusqu'à l'arrêt du
saignement

Garrot spécifique
(tourniquet)



matériel mis en place
dans les VSAV

Le garrot sera également utilisé pour les victimes présentant de nombreuses lésions, plusieurs victimes, si l'accès à la plaie est impossible ou dans certaines situations (catastrophes, théâtre d'opérations militaires ou situations apparentée)

Cas particulier : *Les zones non garrotable* (cou, aisselle, fesse, pli inguinal, cuir chevelu)

Il sera utilisé un pansement compressif avec appui sur relief osseux opposé



**Dans tous les cas : le garrot doit être
visible, au plus près de la plaie,
jamais sur une articulation, noter l'heure de pose**

Section de membre :

Réaliser un pansement compressif même en l'absence de saignement



Principe de conditionnement d'un membre sectionné

2 sacs plastiques

Compresse

Glaçons

SET membre sectionné
si disponible dans le VSAV




Pochette récupération d'un membre

Pochette de froid

Hémorragies extériorisées : saignement par les orifices naturels :

Le nez :



La bouche :



Allonger la victime sur le côté ou en demi-assise si elle ne supporte pas d'être allongée

Surveiller et couvrir la victime

L'oreille :

Allonger la victime et faciliter l'écoulement



Vaginale :

Position d'attente allonger sur le côté gauche (si grossesse visible)

Date prévue des dernières règles et de l'accouchement

Proposer des serviettes ou pansements absorbants pour mettre entre les cuisses





Les hémorragies



Observer




Arrêter immédiatement toute cause évidente d'hémorragie



Position d'attente allongée

Administer de l'oxygène si hémorragie sans présence du pouls radial



Réaliser et transmettre le bilan ou selon la gravité, obtenir rapidement une aide médicale



Couvrir



Surveiller